


第10章 循環器病対策【問26～問28】

1 脳卒中の主な初期症状の認知度【問26】

【全体の状況】

脳卒中の主な初期症状について、知っているものを複数回答で尋ねたところ、「ろれつが回らない」が87.4%で最も多く、次いで「顔の片側がゆがむ」が51.4%であった。(図表10-1-1)

図表10-1-1 脳卒中の主な初期症状の認知度（複数回答）



図表10-1-2 脳卒中の主な初期症状の認知度（複数回答）—地域別、性・年代別

(%)						
	n	ろれつが回らない	顔の片側がゆがむ	左右いずれかの腕に力が入らない	どれも知らなかった	無回答
全 体	1,185	87.4	51.4	50.3	9.9	1.1
【地 域 別】						
横 浜	477	86.8	56.4	52.2	10.1	0.6
川 崎	160	90.6	49.4	51.3	7.5	0.6
相 模 原	77	88.3	46.8	48.1	10.4	1.3
横 須 賀 三 浦	104	85.6	45.2	37.5	12.5	1.0
県 央	115	88.7	50.4	55.7	9.6	1.7
湘 南	187	88.8	48.7	49.2	7.0	2.1
県 西	55	85.5	45.5	50.9	14.5	-
【性・年代別】						
男 性	536	85.6	45.9	43.3	11.6	1.3
女 性	603	90.0	56.2	56.9	7.6	0.5
男性 18～29歳	18	72.2	27.8	27.8	27.8	-
30 歳 代	43	81.4	30.2	30.2	16.3	-
40 歳 代	112	86.6	51.8	42.9	11.6	-
50 歳 代	114	87.7	43.0	48.2	9.6	-
60 歳 代	107	91.6	53.3	50.5	7.5	0.9
70～74歳	61	85.2	42.6	37.7	11.5	3.3
75歳以上	81	79.0	46.9	42.0	13.6	4.9
女性 18～29歳	35	82.9	48.6	54.3	14.3	-
30 歳 代	64	81.3	42.2	32.8	14.1	-
40 歳 代	121	86.0	46.3	47.1	13.2	-
50 歳 代	157	96.8	62.4	60.5	3.2	-
60 歳 代	111	94.6	64.9	70.3	3.6	0.9
70～74歳	45	97.8	64.4	71.1	-	-
75歳以上	70	81.4	57.1	58.6	10.0	2.9


2 脳卒中への適切な対応の認知度【問27】

【全体の状況】


脳卒中は、発症後すぐに救急車を呼ぶなど、医療機関で適切な治療を行えば、後遺症を含めたその後の状態が改善される可能性が高まることを知っているか尋ねたところ、「知っている」が86.4%であった。

一方、「知らなかった」が12.7%であった。(図表10-2-1)

図表10-2-1 脳卒中への適切な対応の認知度



図表10-2-2 脳卒中への適切な対応の認知度—地域別、性・年代別




3 心臓病の再発防止対策の認知度【問28】

【全体の状況】

心臓病の再発を防ぐためには、治療後の適度な運動療法を中心としたリハビリテーションが重要であることを知っているか尋ねたところ、「知っている」が51.9%であった。

一方、「知らなかった」が47.3%であった。(図表10-3-1)

図表10-3-1 心臓病の再発防止対策の認知度



図表10-3-2 心臓病の再発防止対策の認知度—地域別、性・年代別

