


第8章 循環器病対策【問20～問22】

1 脳卒中の主な初期症状の認知度【問20】

【全体の状況】

脳卒中の主な初期症状について、知っているものを複数回答で尋ねたところ、「ろれつが回らない」が89.2%で最も多く、次いで「顔の片側がゆがむ」が52.2%であった。(図表8-1-1)

図表8-1-1 脳卒中の主な初期症状の認知度（複数回答）



図表8-1-2 脳卒中の主な初期症状の認知度（複数回答）－地域別、性・年代別

(%)						
	n	ろれつが回らない	顔の片側がゆがむ	左右いずれかの腕に力が入らない	どれも知らなかった	無回答
全 体	1,698	89.2	52.2	52.0	8.7	0.7
【地 域 別】						
横 浜	677	88.8	55.1	53.3	9.2	0.3
川 崎	241	87.6	51.5	51.5	10.4	0.8
相 模 原	121	92.6	50.4	48.8	5.8	0.8
横 須 賀 三 浦	111	91.0	53.2	55.0	9.0	-
県 央	176	88.1	48.3	51.7	9.7	1.7
湘 南	272	90.1	49.6	50.7	7.4	1.1
県 西	74	89.2	45.9	47.3	8.1	-
【性・年代別】						
男 性	703	86.1	47.5	47.4	11.4	0.9
女 性	935	91.3	56.0	55.2	7.0	0.5
男性 18～29歳	31	64.5	32.3	32.3	29.0	3.2
30 歳 代	54	83.3	33.3	35.2	16.7	-
40 歳 代	126	82.5	39.7	42.1	15.1	0.8
50 歳 代	179	89.4	46.9	46.4	8.4	0.6
60 歳 代	153	89.5	56.2	52.9	7.2	1.3
70～74歳	57	89.5	57.9	63.2	7.0	1.8
75歳以上	102	85.3	51.0	49.0	12.7	-
女性 18～29歳	56	71.4	32.1	26.8	26.8	-
30 歳 代	112	81.3	42.0	41.1	14.3	0.9
40 歳 代	175	92.0	48.0	49.1	6.3	1.1
50 歳 代	220	95.0	57.7	54.1	3.2	0.5
60 歳 代	179	96.1	65.9	63.1	3.4	-
70～74歳	60	93.3	55.0	63.3	5.0	-
75歳以上	132	93.9	72.7	74.2	5.3	0.8


2 脳卒中への適切な対応の認知度【問21】

【全体の状況】


脳卒中は、発症後すぐに救急車を呼ぶなど、医療機関で適切な治療を行えば、後遺症を含めたその後の状態が改善される可能性が高まることを知っているか尋ねたところ、「知っている」が86.8%であった。

一方、「知らなかった」が12.3%であった。(図表8-2-1)

図表8-2-1 脳卒中への適切な対応の認知度



図表8-2-2 脳卒中への適切な対応の認知度—地域別、性・年代別




3 心臓病の再発防止対策の認知度【問22】

【全体の状況】

心臓病の再発を防ぐためには、治療後の適度な運動療法を中心としたリハビリテーションが重要であることを知っているか尋ねたところ、「知っている」が53.8%であった。

一方、「知らなかった」が45.5%であった。(図表8-3-1)

図表8-3-1 心臓病の再発防止対策の認知度



図表8-3-2 心臓病の再発防止対策の認知度—地域別、性・年代別

